



Lasy Państwowe



Lasy Państwowe

Brudnica mniszka (*Lymantria monacha* L.)



Systematyka

Typ: Stawonogi (*Arthropoda*)

Gromada: Owady (*Insecta*)

Rząd: Motyle (*Lepidoptera*)

Rodzina: Brudnicowate (*Lymantriidae*)

Rodzaj: Brudnica (*Lymantria*)

Gatunek: Brudnica mniszka (*Lymantria monacha* L.)

♀



♂



Cykl rozwojowy brudnicy mniszki













Zagrożenie trwałości lasu







Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 233/2022d z dnia 28.03.2022 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 39/2014zr z dnia 28.03.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, Parc d'Affaires de Crécy, 10A Rue de la Voie Lactée, F - 69370 Saint Didier au Mont-d'Or, Republika Francuska, tel. +33 478 64 32 60; +48 668 667 870, e-mail: polish.labels@sumitomo-chem.fr

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Towarzystwo Chemiczne DANMAR, ul. Nasienna 1, 91 – 231 Łódź, tel./fax: 42 650 95 50, biuro@danmar.eu

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin: (...)

Foray 76B

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

Bacillus thuringiensis subsp. *kurstaki*, szczep ABTS-351 – 206,5 g/l (18,44%).

Zezwolenie MRiRW nr R- 39/2014zr z dnia 28.03.2014 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 233/2022d z dnia 28.03.2022 r.

EUH 208 - Zawiera *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*, szczep ABTS-351. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P280 - Stosować rękawice ochronne.

OPIS DZIAŁANIA

Mikrobiologiczny środek owadobójczy w formie stężonego koncentratu do stosowania aparaturą agrolotniczą i naziemną (opryskiwacz sadowniczy). Środek przeznaczony jest do profesjonalnego zastosowania w ochronie drzew iglastych i liściastych przed larwami szkodników zjadających liście. Na roślinie działa powierzchniowo.

STOSOWANIE ŚRODKA

Drzewostany sosnowe

Gąsienice brudnicy mniszki, gąsienice barczatki sosnowki.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.


Środek stosować aparaturą ULV bez rozcieńczenia.

Termin stosowania: Środek stosować, gdy widoczne są gąsienice, zaś rozwój liści jest odpowiedni dla zapewnienia właściwego depozytu środka na liściach. W sezonie wykonać 1-4 zabiegi, w zależności od nasilenia występowania szkodnika.

Minimalny odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Zagrożenie ze strony brudnicy mniszki na terenie nadleśnictw RDLP Gdańsk w 2025 roku



Legenda

RDLP Gdańsk prognoza 2025

zagrożenie ++


zagrożenie +++





Las Państwowy

Nadleśnictwo Kaliska pole zabiegowe w 2024 roku



Pola zabiegowe dla Nadleśnictwa Kaliska w 2024r.

pola zabiegowe Kaliska 2024

Fo


Ke


Mo



Las Państwowy

Nadleśnictwo Kaliska zagrożenie ze strony brudnicy mniszki w 2025 roku





Legenda


skupiska gąsienic w tzw. "lusterkach"

- L 0/+
- L +
- L ++
- L +++



Las Państwowy


Nadleśnictwo Kościerzyna prognozowane zagrożenie ze strony brudnicy mniszki w 2025 roku





Nadleśnictwo Kościerzyna


zagrożenie ze strony brudnicy mniszki w 2025 roku






Las Państwowy

Nadleśnictwo Lipusz prognozowane zagrożenie ze strony brudnicy mniszki w 2025 roku



Nadleśnictwo Lubichowo - pole zabiegowe z 2024 roku




Legenda

Lubichowo Zabiegi 2024


 Fo

Nadleśnictwo Lubichowo - zagrożenie ze strony brudnicy mniszki w 2025 roku





Zagrożenie ze strony brudnicy mniszki na Półwyspie Helskim w 2025 roku





Lasy Państwowe

Dziękuję za uwagę

Zespół Ochrony Lasu w Gdańsku
ul. Rogaczewskiego 9 / 19
80-804 Gdańsk
zolgdansk@lasy.gov.pl